




Desafíos en la producción de lechones

Para un lechón sano, el periodo cercano al destete es especialmente importante, dado que la protección maternal vía calostro decrece pero los animales no han desarrollado aún un sistema inmunitario competente. El calostro de baja calidad o su ausencia y el stress conlleva a un tracto gastrointestinal desafiado por patógenos como bacterias y virus. Las consecuencias sobre el desempeño pueden ser drásticas e incluso mortales.


Mecanismo de acción




Arranque saludable - Desarrollo óptimo durante la vida productiva

Al nacer y alrededor del destete los lechones afrontan un vacío inmunitario. Globigen® Jump Start contiene inmunoglobulinas naturales de huevo.

Debido a su elevada efectividad, las IgY pueden utilizarse como un sustituto efectivo para el plasma. Ofrecemos servicio de reformulación y apoyo técnico para veterinarios, nutricionistas y consultores.



Patógenos comunes en la producción porcina



Sus Ventajas



Recomendaciones

	Alimento	Dosis recomendada*
Lactorreemplazante	Leche suplementaria / lactorreemplazante	4000 - 8000 g/to
Lactoiniciador / Pre-Starter	Antes de destetar / al destete	2000 g/to
Destete / inicio engorde	2-3 semanas post destete	1000 g/to
Starter / Pienso lechones	Hasta el traslado	500 g/to